



MINISTERIO DE DEFENSA

FICHA TÉCNICA

**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO MÉDICO Y SANIDAD MILITAR DE
LAS FUERZAS ARMADAS.**

**PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS
REFERENCIA: MIDE-CCC-CP-2021-0030**

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Junio 2021



1.0 DISPOSICIONES GENERALES

Las Informaciones y especificaciones técnicas descritas en el presente documento son de **uso confidencial**, con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes puedan preparar propuestas para el presente proceso. Las mismas no podrán ser divulgadas o publicadas por los Oferentes o el personal que este bajo la responsabilidad del mismo.

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con la finalidad de que los Oferentes puedan presentar sus propuestas, a continuación se detallan las especificaciones mínimas que deberán cumplir los bienes objeto del presente proceso de compras y contrataciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE UNICO

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Atropina img	UD	300
-Atropina sulfato serra pamies 1 mg/ml solución inyectable. -Medicación preanestésica: antes de la anestesia general, para disminuir el riesgo de inhibición vagal sobre el corazón y para reducir las secreciones salivar y bronquial. -Espasmolítico: en las contracciones de las fibras lisa, en cólico hepáticos y renales. Está indicado como coadyuvante en el tratamiento del síndrome del intestino irritable (colon irritable, colitis mucosa y colon espástico).			
2	Amiodarona 200 mg amp	UD	200
-El principio activo es amiodarona hidrocloreuro. -Cada comprimido contiene 200 mg de amiodarona hidrocloreuro. -Los demás componentes son: lactosa monohidrato, sílice coloidal anhidra, carboximetil almidón sódico (tipo A) (procedente almidón de patata), povidona (K-30) y estearato de magnesio. -La amiodarona se usa para tratar y prevenir ciertos tipos graves y posiblemente mortales de arritmia ventricular (ritmo cardíaco anormal) cuando otros medicamentos no dieron resultado o el paciente no los tolera. -La amiodarona pertenece a una clase de medicamentos llamados antiarrítmicos.			
3	Adrenalina img/1 ml.	UD	300
-Cada ml contiene 1 mg de epinefrina (adrenalina) en forma de epinefrina bitartrato. -Excipientes con efecto conocido Metabisulfito de sodio: 0,1 mg/ml Sodio: 3,47 mg/ml. -Solución inyectable.			
4	Bicarbonato de sodio	UD	200
Bicarbonato sódico 1/6 M Braun Solución para perfusión			
5	Dexametasona 8 mg. Ampolla	UD	300
-Fosfato sódico de dexametasona 8,8 mg -Sulfato de sodio anhidro 2,0 mg. -inyección IM, IV, IS, IL, IA			

6	Dobutamina 250mg/20 ml.	UD	200
Dobutamina 250mg/20 ml.			
7	Dimenhidrinato 50 mg	UD	200
- Dimenhidrinato Galenica 50 mg comprimidos sublinguales -Cada comprimido sublingual contiene 50 mg de dimenhidrinato (que corresponde a no menos de 26, 5 mg y no más de 27,75 mg de difenhidramina y no menos de 22,0 mg y no más de 23,25 mg de 8-cloroteofilina). -Para consultar la lista completa de excipientes ver sección			
8	Difenhidramina 50 mg	UD	200
- Difenhidramina 50 mg comprimidos -Cada comprimido contiene 50 mg de hidrocloreto de difenhidramina (equivalente a 43,8 mg de difenhidramina base). -Excipiente con efecto conocido: 168,75 mg de lactosa. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección.			
9	Fenitaina sodica 100 mg ampolla	UD	200
-Cada ampolla de 2 ml contiene 100 mg de fenitoína sódica. Cada ampolla de 5 ml contiene 250 mg de fenitoína sódica. -Excipiente(s) con efecto conocido: Cada ampolla de 2 ml contiene 0, 2 ml de etanol y 0,8 ml de propilenglicol (E-1520).			
10	Lidocaína con epinefrina 2%	UD	100
-Clorhidrato de lidocaína..... 20 mg -Epinefrina 1 x 200,000..... 0.005 mg -Lidocaína con epinefrina es un anestésico local por infiltración.			
11	Lidocaína sin epinefrina 2%	UD	100
-Cada ml de Lidocaína normon 10 mg/ml contiene: lidocaína hidrocloreto, 10 mg/ml (100 mg por ampolla de 10 ml). Excipientes: Sodio (como cloruro de sodio) 28 mg/ampolla (2,8 mg/ml). Cada ml de Lidocaína NORMON 20 mg/ml contiene: lidocaína hidrocloreto, 20 mg/ml (200 mg por ampolla de 10 ml ó 100 mg por ampolla de 5 ml). Excipientes: Sodio (como cloruro de sodio) 10,4 mg/por ampolla de 5 ml (2,08 mg/ml). Sodio (como cloruro de sodio) 20,8 mg/por ampolla de 10 ml (2,08 mg/ml). -Cada ml de Lidocaína NORMON 50 mg/ml contiene: lidocaína hidrocloreto, 50 mg/ml (500 mg por ampolla de 10 ml). Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1			
12	Furosemida 20 mg	UD	300
La furosemida se utiliza para tratar el edema (la retención de líquidos; exceso de líquido retenido en los tejidos corporales) causado por varios problemas médicos, incluyendo el corazón, el riñón y enfermedades del hígado.			
13	Gluconato de calcio ampolla	UD	200
-Composición: Cada ampolla de 10 ml contiene: Gluconato de Calcio 9.776 mg. -Excipientes c.s.p. 10.0 ml. Excipientes: Sacarato de Calcio, Agua para Inyectables. Osmolaridad: 0.275 mOsm/ ml. -Cada ampolla de 10 ml aporta 0.232 mmol/ml de ion Calcio (0.465 mEq/ml).			
14	Metamizol sodico 1 gr	UD	300

-Metamizol sódico..... 2.5 mg y 1 g
 - Está indicado para el dolor severo, dolor postraumático y quirúrgico, cefalea, dolor tumoral, dolor espasmódico asociado con espasmos del músculo liso como cólicos en la región gastrointestinal, tracto biliar, riñones y tracto urinario inferior. Reducción de la fiebre refractaria a otras medidas.
 -Debido a que metamizol sódico puede inyectarse por vía I.V., es posible obtener una potente analgesia en muchas condiciones y tener control del dolor. Aun con altas dosificaciones no causa adicción ni depresión respiratoria.

15	Heparina	UD	300
-Cada vial de 5 ml de contiene: Heparina sódica Sala 1.000 UI/ml.....(10 mg) de heparina sódica/ml (obtenida de la mucosa intestinal porcina). -(cada vial de 5 ml contiene 5.000 U.I. (50 mg.)) -Heparina sódica Sala 5.000 UI/ml..... (50 mg) de heparina sódica/ml (obtenida de la mucosa intestinal porcina). -(cada vial de 5 ml contiene 25.000 U.I. (250 mg.)) -Excipientes con efecto conocido Heparina sódica Sala 1.000 UI/ml: contiene 11,45 mg metilparahidroxibenzoato sódico (E-219) y 1,12 mg propilparahidroxibenzoato sódico (E-217). -Heparina sódica Sala 5.000 UI/ml: contiene 11,45 mg metilparahidroxibenzoato sódico (E-219) y 1,12 mg propilparahidroxibenzoato sódico (E-217). Contiene 34 mg de sodio por vial. Para consultar la lista completa de excipientes.			
16	Omeprazol 40 mg	UD	100
Omeprazol 40 mg			
17	Ranitidina ampolla	UD	200
-Cada ml de solución inyectable contiene: Ranitidina (hidrocloruro) 10 mg -Cada ampolla de 5 ml contiene 50 mg de ranitidina (como hidrocloruro). Excipiente (s) con efecto conocido: hidróxido de sodio0,281 mg.			
18	Solución salina 0.9% 1000 ml	UD	200
Cloruro de sodio Pisa 0.9 % inyectable 1000 m			
19	Solución salina 0.9% 500 ml.	UD	200
Solución salina 0.9% 500 ml.			
20	Sol. Mixto 0.33% 1000 ml.	UD	200
Sol. Mixto 0.33% 1000 ml.			
21	Soluciones en ringer 1000 ml.	UD	200
Soluciones en ringer 1000 ml.			
22	Sol. Dextrosa 5% 100 ml	UD	200
Sol. Dextrosa 5% 100 ml			
23	Sol. Dextrosa al 50% 100 ml.	UD	200
Sol. Dextrosa al 50% 100 ml.			
24	Sulfato de magnesio 1 Gr	UD	200
Sulfato de magnesio 1 gr			
25	Trofilina	UD	100
La teofilina se usa para prevenir y tratar las sibilancias, la falta de aliento y la opresión en el pecho causada por el asma, la bronquitis crónica, el enfisema y otras enfermedades pulmonares. Relaja y abre las vías respiratorias en los pulmones, facilitando la respiración.			
26	Vitamina k	UD	200
Vitamina k			
27	Gel de sonografía	UD	02
Gel de sonografía			
28	Gel lubricante	UD	100
Gel lubricante			

29	Tubo endotraqueal #2.5 sin balon	UD	50
Tubo endotraqueal #2.5 sin balon			
30	Tubo endotraqueal #3.0 sin balon	UD	50
Tubo endotraqueal #3.0 sin balon			
31	Tubo endotraqueal #3.5 sin balon	UD	50
Tubo endotraqueal #3.5 sin balon			
32	Tubo endotraqueal #4.0 sin balon	UD	50
Tubo endotraqueal #4.0 sin balon			
33	Tubo endotraqueal #4.5 sin balon	UD	50
Tubo endotraqueal #4.5 sin balon			
34	Tubo endotraqueal #5.0 sin balon	UD	50
Tubo endotraqueal #5.0 sin balon			
35	Tubo endotraqueal #5.5 sin balon	UD	50
Tubo endotraqueal #5.5 sin balon			
36	Hidrocortisona	UD	500
hidrocortisona equivalente a..... 100 y 500 mg			
37	Nitroglicerina 50 mg	UD	200
La nitroglicerina es un vasodilatador, un medicamento que abre los vasos sanguíneos para mejorar el flujo de sangre. Se usa para tratar los síntomas de angina, como dolor o presión en el pecho que sucede cuando no fluye suficiente sangre al corazón.			
38	Noradrenalina	UD	200
La Norepinefrina (llamada también noradrenalina o levarterenol) es una catecolamina que estimula receptores adrenérgicos alfa1 y, levemente, receptores adrenérgicos beta1, sin efecto beta.			
39	Digoxina amp	UD	200
Solución inyectable. Líquido transparente incoloro, de pH entre 6,7 y 7,3. Insuficiencia cardíaca: Digoxina está indicada en el tratamiento de insuficiencia cardíaca crónica donde el problema principal es la disfunción sistólica.			
40	Fijadores tubos endotraquiales	UD	50
Fijadores tubos endotraquiales			
41	Conexión t p/tubos endotraqueales	UD	50
Conexión t p/tubos endotraqueales			
42	Ambu neonatal (resucitador)	UD	50
Ambu neonatal (resucitador)			

Nota: Los Oferentes/Proponentes deberán incluir todos los medicamentos solicitados y con las especificaciones y componentes descritos en la presente ficha técnica, solo se adjudicara a un solo oferente.

3.0 ALCANCE DE LOS BIENES

Los Oferentes deberán estimar que, para cumplir con el objetivo de los requerimientos, dichos medicamentos se deberán entregar en el Cuerpo Médico y Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas, ubicado en este Ministerio de Defensa en horarios de 08:00 am a 2:00 pm, en las denominaciones y cantidades descritas en el Puntos 2.0 “Especificaciones Técnicas”.

3.1. PLAN DE ENTREGA

El Oferente/Proponente que resulte adjudicado del presente proceso por Comparación de Precios deberá tener disponibles para hacer entrega inmediata la totalidad de los medicamentos objeto

del presente proceso o en su defecto presentar un cronograma de entrega inferior a las 72 horas (3) días hábiles.

